



ATIVANDO PRINCÍPIOS
ISO | 9001:2008



INFORME TÉCNICO FARMACÊUTICO

BITARTARATO DE COLINA

⚡ Precursor da acetilcolina

DCB: Não consta



Indicações:

A colina é um precursor da acetilcolina, usada em distúrbios da memória e na doença de Alzheimer(1).



Propriedades:

Esta envolvida no metabolismo lipídico e age como um doador de metila em vários outros processos metabólicos. A colina tem sido considerada ser uma vitamina, embora suas funções não justifiquem sua classificação como vitamina. Fontes de colina podem ocorrer em lecitina, incluindo ovos e vegetais e gordura animal. A colina tem sido usada para cirrose, tratamento de demência e desordens extrapiramidais. A colina pode ser usada como sais de bitartarato ou citrato dihidrogenado bem como cloridrato(2).



Contra-indicações:

Não constam.



Dose Usual / Posologia:

Usado na faixa de 100 a 600mg de colina ao dia, divididos em 2 tomadas(2).



Precauções:

Não constam.



Reações Adversas:

Não constam.



Interações Medicamentosas:

Não constam.



Informações Farmacotécnicas:

Não constam.



Referências Bibliográficas:

1. BATISTUZZO, J.A.O., ITAYA, M., ETO, Y. *Formulário Medico Farmacêutico*. 3ed, São Paulo: Pharmabooks, 2006.
2. MARTINDALE - *The Extra Pharmacopoeia*. 29ªEd. 1989.

Informações mais completas e referências científicas disponíveis sob consulta.
Entre em contato conosco através do e-mail: sac@deg.com.br
ITF Bitartarato de colina - V.01 - abril / 2007



ATIVANDO PRINCÍPIOS
ISO | 9001:2008



ESTA EMPRESA APÓIA
A FUNDAÇÃO ABRINQ

DEG Importação de Produtos Químicos Ltda.

Unidade 1: R. Jurupari, 775 / 779 / 803 - Jd. Oriental - São Paulo / SP - CEP: 04348-070
Unidade 2: R. José Mariano Filho, 200 - Jd. Oriental - São Paulo / SP - CEP: 04347-180
www.deg.com.br - deg@deg.com.br - 0800-7011974